

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

10 mag 24

10 mag 24

SI CHIUDE UNA UNA PRIMA DECADE DI MAGGIO QUANTO MAI PIOVOSA CON ACCUMULI PROSSIMI AI 200 MM DALL'INIZIO DEL MESE. L'attuale parentesi di alta pressione non durerà a lungo. E' infatti previsto il ritorno delle piogge (perduranti per tutta settimana?) da lunedì. Nei vigneti di Nebbiolo medi, con ancora un discreto anticipo, ci si avvicina alla fioritura (inizio previsto entro 2 settimane).

PERONOSPORA**RISCHIO**

ATTENZIONE! FASE ESTREMAMENTE DELICATA DELLA DIFESA IN AVVIO. SI RACCOMANDA MASSIMA TEMPESTIVITA'

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO

NON PIÙ TARDI DI DOMENICA 12 MAGGIO**UTILIZZANDO**

LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE IN FORMAZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIÀ LE CONTENGONO

NB: TRA PARENTESI IL NUMERO MAX CONSIGLIATO DI TRATT./ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMITE: SL

***FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM(4), FOLPET(4).
CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

IN MISCELA CON

5***FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3) : BENALAXYL-M (3), METALAXYL-M (3). METALAXIL REINTRODOTTO (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)

OPPURE

AMETOCTRADINA (QoS) (3).

VALUTANDO L'AGGIUNTA O SE IN FORMULAZIONE CON

***FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6)

O IN FINE

FLUOPICOLIDE (2) +FOSETY AL

OIDIO E BLACK ROT (MARCIUME NERO)**RISCHIO**

SINTOMI POCO FREQUENTI MA CON PIOGGE RIPETUTE AUMENTA IL RISCHIO DI MARCIUME NERO. INFEZIONI IN QUESTA FASE SI RIVELANO MOLTO PIÙ AVANTI

ASSOCIARE ALL'ANTIPERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA

***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTER.TIVA)

O

5***FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO ANCHE ASSIEME A ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN(3) : AZOXY (2)/TRIFLOXY-STROBYN

ALTRI CONSIGLI TECNICI

VALUTARE IL RICORSO A FERTILIZZANTI FOGLIARI A BASE DI ALGHE/BORO IN PREPARAZIONE ALLA FIORITURA. NON CONGIMI AD ALTO TITOLO DI AZOTO!

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).