



Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi
 Cavaglio d'Agogna Suno
 Mezzomerico Barengo
 Romagnano Sesia
 Marano Ticino
 Sizzano Boca
 Maggiora
 Bogogno Ghemme
 Briona Fara Cressa

10

11/07/2023

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

Situazione

A seguito del riscontro dei primi segnali di lignificazione dei tralci su Nebbioli/Vespoline, l'esordio dell'invaiaura è prevista, in tali casi, negli ultimi giorni del mese (LIEVE RITARDO). In chiusura la prima vera breve ondata di calore dell'anno con picchi di temperature oltre i 40 °C ieri. Nuovo passaggio temporalesco localizzato più probabilmente tra giovedì e prima parte di sabato. A seguire ripresa nell'innalzamento delle temperature. ATTENZIONE ALLE SFOGLIATURE DEI VIGNETI! LE UVE, IN PARTICOLARE I NEBBIOLI, SONO ESTREMAMENTE SENSIBILI A DANNI DA SCOTTATURE INTENSI (GIÀ RILEVATI IN QUESTI GIORNI)! LIMITARE GLI INTERVENTI SUI LATI NORD E/O EST DEL FILARE!

Peronospora

Patogeno in solo discreta frenata in questo passaggio caldissimo, ma le nuove macchie e la sporulazione anche su bacche di discreto diametro non danno segnali NETTI di arresto anche con le temperature descritte ben oltre i 35°C. Occorre pertanto riproteggere la vegetazione ancora in fase attiva di crescita

INTERVENIRE

ENTRO

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO

Utilizzando prodotti commerciali contenenti esclusivamente, o, se diversamente indicato, in alternativa (o), in alternativa o aggiunta (e/o), in associazione (+), ovvero anche in formulati commerciali che ne contengono in miscele già formulate (mixgf):

BIO

*FAMIGLIA/GRUPPO: 'COPERTURA RAMEICI': (12 KG RAME METALLO/ANNO MAX. NEL TRIENNIO 2022-24 CON MAX 5 KG/ANNO) PREFERIBILMENTE TRA QUELLI A MAGGIOR PERSISTENZA (PER. ES SOLFATO TRIBASICO, OSSICLORURI) OPPURE IDROSSIDI A MAGGIOR PRONTEZZA IN CASO DI FORTE TEMPORALE NOTTURNO

+ *FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): FOSETYL AL(SenzaimiteL); FOSFO.TO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).

Oidio

Si ricorda, fondamentale, nella riuscita dalla difesa da questo patogeno quest'anno particolarmente virulento, la corretta gestione della vegetazione.

In ABBINAMENTO ALL'ANTIPERONOSPORICO SI CONSIGLIA

L'associazione con prodotti contenenti Zolfo o bicarbonato di potassio (Utilizzabili entrambi in difesa Biologica)

In caso di situazioni predisponenti ed in chiave di prevenzione antibotritica (con le ulteriori specifiche del bollettino nr 9 precedente e sotto) IN aggiunta (a minimo dosaggio di zolfo)

*FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO ANCHE CON ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN) : AZOXY-(2 TRATT.MAX)- TRIFLOXY-PYRACLO-STROBIN (ENTRAMBI 3MAX))

Botrite

l'andamento temporalesco passato e che si è riproposto/ripropone con elevata frequenza è da tenere in grande considerazione come fattore predisponente per questo patogeno. Si ritiene FONDAMENTALE nella strategia di difesa antibotritica il posizionamento di un trattamento preventivo almeno nella fase di pre.chiusura grappolo. Difficile che interventi singoli in pre.raccolta mostrino efficacia significativa. CONTRO QUESTA AVVERSITA' SONO AMMESSI AL MASSIMO 2 TRATTAMENTI CON S.A. DI SINTESI, IN AGGIUNTA ALLE QUALI È POSSIBILE, COMPLEMENTARMENTE RICORRERE A S.A. O AGENTI ATTIVI BIOLOGICI. PER TUTTE LE SOSTANZE DI SINTESI SEGUENTI È AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO/ANNO : FLUDIOXONIL, CIPRODINIL**, PIRIMETANIL**, BOSCALID***, ISOFETAMID***, FENEXAMIDE, FENPIRAZAMINE: PER TUTTI AL MASSIMO 1 TRATTAMENTO/ANNO. **L'USO DI CIPRODINIL, INOLTRE, ESCLUDE QUELLO DI PIRIMETANIL E VICEVERSA. TRA (***)TRA BOSCALID+ISOFETAMID E FLUXAPYROXAD ANTIOIDICO MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO) .. FLUAZINAM È CONSIDERATO IN TARGET ANTIPERONOSPORICO (4 TRATT MAX)

IL TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO CONTRO SCAFOIDEUS TITANUS- VETTORE DI FLAVESCENZA DORATA
 IN PRESENZA DI POPILLIA JAPONICA (IN GENERALE, IN QUESTO WEEKEND, SOLO DISCRETAMENTE AUMENTATA, MA FINO A RAGGIUNGERE LIVELLI DI SOGLIA IN MODO MOLTO PUNTIFORME), ESEGUIRE IL SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA INDICATO ASSIEME AL TRATTAMENTO ANTIFUNGINO ORA CONSIGLIATO. DIVERSAMENTE, POSSIBILE ATTENDERNE GLI SVILUPPI DEMOGRAFICI IN QUELLA CHE DOVREBBE ESSERE LA SETTIMANA DEFINITIVA PER POTER CONSIDERARE "CHIUSA" SU LIVELLI NUMERICI DRASTICAMENTE RIDIMENSIONATI LA SUA ONDATA NELL'ANNO IN CORSO . IN TAL CASO PROGRAMMARE L'INTERVENTO PREFERIBILMENTE CON LE SA ED ENTRO IL TERMINE DELL'INTEVALLO INDICATO NEL BOLLETTINO SPECIFICO.

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE