



Servizio tecnico Alto Piemonte

7
2022

Bollettino Difesa Integrata Volontaria VITE

7
2022

Del 29 luglio ore 22.00

SITUAZIONE

In chiusura il mese di luglio probabilmente più caldo di sempre, paragonabile solo al precedente 2015. La fase finale temporalesca appena conclusa non ha purtroppo portato apporti di piogge significative. Sono infatti state di circa 10 mm da Briona in calo verso nord (con eccezione di BOCA, 30 mm) aggravando, in prospettiva, la situazione di forte stress nella quale versano i vigneti. Nonostante tutto l'invasatura è esordita, generalmente, con un generale forte anticipo. Aumento di riscontri, in particolare su nebbiolo, fenomeni di ustioni/disseccamento su intere parti di grappolo. Prevista una forte riduzione della resa vendemmiale.

OIDIO. Uncinula necator

di ripristinare la protezione dei vigneti **intervenedo ENTRO DOMENICA 31 LUGLIO** con prodotti a base di Zolfo Bagnabile a dosaggi solo medi di etichetta (attenzione alle ustioni!) o **BICARBONATO DI POTASSIO** complementandoli, se compatibili, con prodotti biostimolanti (cerevisane, laminarina ecc) preferibilmente con azione anche antiperonosporica (scegliendo tra quelli bivalenti) oppure ricorrendo a Cos-Oga e/o Sostanze attive di biocontrollo.

Si consiglia

intervento è da considerarsi conclusivo sulla maggior parte dei vigneti di erbaluce (valutare un successivo intervento solo sulla parte alta della vegetazione nei vigneti più vigorosi)

Tale

PERONOSPORA. Plasmopara viticola

Fare ricorso esclusivo a prodotti di copertura rameici (dosaggi bassi) preferibilmente a maggior persistenza (ossicloruro, solfato tribasico) curando bene la distribuzione nella parte alta della vegetazione.

SSECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA CONTRO SCAFOIDEO TITANUS, VETTORE DI FLAVESCENTZA DORATA .

Vedere bollettino specifico 7bis in CASO DI DUE TRATTAMENTI INSETTICIDI CON ACETAMIPRID E/O ETOFENPROX E/O DELTAMETRINA UTILIZZATI CONTRO POPILLIA NEL MESE DI LUGLIO, SI CONSIGLIA DI MONITORARE LA PRESENZA DEL VETTORE INSTALLANDO LE APPOSITE TRAPPOLE CROMOTROPICHE ED INTERVENIRE NUOVAMENTE IN CASO DI CATTURE SETTIMANALI ELEVATE. PREFERIBILMENTE TRA I PRINCIPI ATTIVI INDICATI PRIVILEGIARE FLUPYRADIFURONE O ACETAMIPRID (SE NON GIÀ UTILIZZATO DUE VOLTE)

1

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE