

1 ago 24

**SITUAZIONE**

PRIMI RISCONTRI DI INVAIATURA SU VESPOLINA E LE PRIME BACCHE DI NEBBIOLO NEI VIGNETI PIÙ PRECOCI/MENO VIGOROSI. LA CRESCITA DELLA NUOVA VEGETAZIONE NON ANCORA ATTENUATA CHE DETERMINA, ASSIEME ALLA GESTIONE DELL'INERBIMENTO, TUTTORA INTENSITA' LAVORATIVA IN VIGNETO NOTEVOLE.

**PERONOSPORA**

**RISCHIO**

IN ATTENUAZIONE NEI VIGNETI MEGLIO ESPOSTI. MA PROSEGUE DISCRETAMENTE -GRAZIE A BAGNATURE FOGLIARI E TASSI DI UMIDITA' RELATIVI ANCORA 'STRAORDINARI'- IN QUELLI PIÙ VIGOROSI E/O NON OTTIMAMENTE GESTITI NELLA VEGETAZIONE GRAZIE ALLE MACCHIE SPORULATE SULLE FEMMINELLE CHE INNESCANO NUOVE INFEZIONI. ASSOLUTAMENTE RACCOMANDATO DI MANTENERE LA COPERTURA PER EVITARNE COMPLETE DEFOGLIAZIONI IN PROSPETTIVA DI VENDEMMIA.

**SI CONSIGLIA DI RITRATTARE A NON PIÙ DI 9-11 GIORNI DAL PRECEDENTE TRATTAMENTO**

**ORIENTATIVAMENTE ENTRO**

**LUNEDÌ**

**5 AGOSTO (AL MASSIMO!)**

MA E' PREFERIBILE ANTICIPARE IPOTIZZATO PASSAGGIO TEMPORALESCO DI SABATO NOTTE NEI VIGNETI CON MAGGIOR PRESENZA DI MACCHIE/PIÙ SOGGETTI

**UTILIZZANDO**

LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE IN FORMAZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIÀ LE CONTENGONO

NB : TRA PARENTESI IL NUMERO MAX CONSIGLIATO DI TRATT./TI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMITE= SL

**\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI' (5 KG RAME METALLO/ANNO MAX. 12 KG/MAX DAL 2022-2024)**

EVENTUALMENTE UN'ULTIMA VOLTA IN MISCELA CON (AD ESCLUSIONE DEI BIANCHI)

**\*\*\*FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MA**

**OIDIO (MAL BIANCO)**

**RISCHIO**

L'ANNATA HA PRESENTATO UNA DIFFUSIONE TARDIVA DEL PATOGENO SOPRA LE RIGHE. RISCONTRO DI ATTACCHI DISCRETI SUI GRAPPOLI ANCHE IN POSIZIONI MENO SOLITE, SEPPUR CON LIEVE INTENSITA' (SALVO CASI PARTICOLARI). ORA LA PRESSIONE DEL PATOGENO E' DESTINATA A FASE CALANTE. LA DIFESA SI PUO' PERTANTO DIVERSIFICARE SOPRATTUTTO CON LA VARIAZIONE DEI DOSAGGI AD ETARRO. LA DIFESA ANTIOIDICA E' DA CONSIDERARSI CHIUSA AL SOPRAGGIUNGERE DELL'INVAIATURA

**\*\*\*ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI:**

Da usare in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai 'tradizionali'. Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/avversità.

**BOTRITE (MUFFA GRIGIA)**

L'ANNATA SI PRESENTA PARTICOLARMENTE PREDISPONENTE PER MANIFESTAZIONE DI ATTACCHI DI MUFFA GRIGIA IN VENDEMMIA, IN PARTICOLARE SU VARIETA' A GRAPPOLO COMPATTO (PIÙ DEL SOLITO LO SARA' QUEST'ANNO), VITIGNI E/O SITI PREDISPONENTI. LA LINEA PREVENTIVA CONTRO QUESTA AVVERSITA' CONTEMPLA LA VALUTAZIONE DELL'USO DI SPECIFICHE S.A. ANTIBOTRITICHE 'PREVENTIVAMENTE' IN INVAIATURA (A FINE SECONDA DECADE DEL MESE) ESSENDO UNA DELLE FASI FENOLOGICHE INDIVIDUATE COME CHIAVE. VALUTARE PERTANTO IL RICORSO A SPECIFICI PRINCIPI ATTIVI ANTIBOTRITICI OPPURE ALTRE S/A ANTIBOTRITICHE E/O SPECIFICI FORMULATI MICRO BIOLOGICI

NOTA BENE : PER BOTRITE AL MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO (SALVO AGGIUNTIVI PRODOTTI BIOLOGICI). **CONSIGLIO GENERALE** (SALVO DIVERSA ESPRESSA INDICAZIONE IN ETICHETTA) DI **NON RIPETERE PIÙ DI UNA VOLTA LO STESSO FORMULATO COMMERCIALE.**

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).