



Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Cavaglio d'Agogna Suno

Mezzomerico Barengo

Romagnano Sesia

Marano Ticino

Sizzano Boca

Maggiora

Bogogno Ghemme

Briona Fara Cressa

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

NR **3**

2021

ore

9.50 del

1 GIUGNO

SITUAZIONE

Nebbiolo in testa in rapidissimo decorso dalla fioritura verso il grano pepe nei siti più precoci. Seguono vespolina, erbaluce poi Uva rara e infine croatina a imminente/ inizio fioritura nei siti più tardivi. Nel weekend cadute piogge da circa 15 fino a 20-25 mm in crescendo verso Nord. Dopo forte ma breve flessione delle temperature, da oggi netto rialzo duraturo. Il mese di maggio chiuso tra i più caldi in assoluto del nuovo millennio. Attesa instabilità temporalesca in crescendo da venerdì. Rapidissima crescita della vegetazione senza evidenti segnali di stress idrico. E' evidente invece come segno premonitore la Boro carenza. Attenzione ad integrare questo microelemento.

OIDIO (Mal Bianco)

Fase fenologica e annata ancora estremamente pericolose

CONSIGLIA entro domani 2 giugno

che contengano, in alternativa tra loro, una delle seguenti s.a.:

*FAMIGLIA/GRUPPO: IBE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : ATTENZIONE TRA ESSI:

FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL-DIFEN/TEBU/CONAZOLO (TUTTI 1 trattamento/MASSIMO/ANNO). mentre: FENBU/PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 TRATTAMENTI/MAX/ANNO).

Alternandoli (2volte-2volte) a :

*FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO ANCHE CON ANTIPERONOSPORICO FAMOXADONE) : AZOXY-TRIFLOXY-PYRACLO-STROBIN (TUTTI 3MAX)

Associare sempre agli antioidici specifici ZOLFO BAGNABILE (SE NON Già in FORMLZ.Ne combi)

POLVERE CON TEMPESTIVITA' **COME INTERVENTO CHIAVE DI RINFORZO ANTIOIDICO**

PERONOSPORA

Restano pochissimi riscontri nelle zone più umide di foglie basali con macchie/infiocescenze colpite. Occorre continuare a proteggere le infiorescenze-grappolini estremamente sensibili ora durante il passaggio temporalesco annunciato, pertanto si consiglia l'aggiunta di prodotti di a doppia /tripla via dove, a base di copertura con METIRAM, DITHIANON, FLUAZINAM) oppure ZOXAMIDE (4/MAX) siano associati INDUTTORI SISTEMICI (8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO):); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX) FOSFONATO DI DISODIO (6MAX), FOSETYL AL(SENZA LIMITI).e/o CIMOXANYL OPPURE A AMETOCTRADINA (QoSi) (3 TRATT/MAX) OPPURE A FLUOPICOLIDE(2 TRATT/MAX) POSSIBILE RICORSO ANCHE ALLE RECENTI MISCELE OXATHIPIPROLIN (2 TRATT/MAX) + ZOXAMIDE (o + FOLPET) (QUEST'ULTIMO ASSOCIATO ANCHE A METALAXIL-M O BENALAXYL-M (NB - M NON STA PER MANCOZEB NON FARE CONFUSIONE!

INFATTI SI RICORDA CHE NON SONO Più UTILIZZABILI, ASSOLUTAMENTE, CHE CONTENGANO DA SOLO O IN MISCELA MANCOZEB (SIGLE M, MZ, ..ZEB...

PRODOTTI

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE