



Servizio tecnico Alto Piemonte

Bollettino Difesa Vite 3.bis

4 maggio 2015

INIZIO DIFESA

PERONOSPORA

Le piogge dei giorni precedenti sono state fortunatamente trascurabili. Possibile proseguimento regime regime coperto/piovvigginoso come quello in corso (ore 8) alternato a schiarite, ma in apertura netta da mercoledì-giovedì.

ATTENZIONE A Possibili uscita di macchie di Peronospora (Foto di riconoscimento) da domani-mercoledì.

Sulle quali occorre essere assolutamente "coperti".

Si prega di segnalare eventuale riscontro di macchie inviando una/due foto bene a fuoco al seguente indirizzo

Pertanto

si conferma di effettuare il primo trattamento appena possibile (da oggi) a mercoledì 6 MAGGIO, evitando però di trattare con vegetazione bagnata e/o rischio di pioggerelle a ridosso (verificare bene l'evoluzione delle previsioni nelle prossime ore).

Utilizzando prodotti di copertura

Gruppo DITIOCARBAMMATI

METIRAM(polyram df)

PROPINEB(antracol)

MANCOZEB (di seguito indicato con MZ o M) (crittox mz 80, Aspor z, m70df, zm 75 , et altri)

Oppure DITIANON (Delan 70 wg)

Con aggiunta di seguente prodotto appartenente alla famiglia dei CAA, penetrante :

DIMETOMORF (forum 50 wp-feudo-quasar) O

MANDIPROPAMID (pergado sc) O

IPROVALICARB O

VALIFENALATE (valis m).

Oppure CIMOXANIL (curzate-vitene et al)

Esistono anche formulazioni già pronte di tali miscele

OIDIO (MAL BIANCO):

VIGNETI A RISCHIO . aggiungere i dosi medio alte di ZOLFO BAGNABILE ((tipo 1500-2000 grammi/ettaro).

Oppure la miscela **PIRACLOSTROBIN+METIRAM (cabrio top)** utile per l'apertura dei trattamenti, avendo polivalenza contro l'escoriosi, la peronospora e l'oidio, oppure

SPIROXAMINA (prosper 300 sc,-veliero) (non più di 2 trattamenti a dosi crescenti)

VIGNETI A BASSO RISCHIO aggiungere

ZOLFO BAGNABILE a dosi più ridotte (x es. 1000 grammi/ha).

Nei primi trattamenti risparmiare prodotto!

Possibile utilizzare una dose ad ettaro (si ottiene moltiplicando la dose ad ettolitro=hl x 10)

RIDOTTA almeno DEL 300% NEL PRIMO TRATTAMENTO, DEL 30% NEL SECONDO

Per es: prodotto a 400g/hl = 4 kg/ha si potrà usare a 3,0 kg/ha NEL PRIMO TRATTAMENTO

Indipendentemente dal volume d'acqua(ridotto) utilizzato per trattare

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI

SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)