Cavaglio d'Agogna Suno
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Sizzano Boca
Bo gog no
Ghemme
Briona
Cressa
Fara

Servizio Intercomunale Colline Novaresi

Bollettino Difesa Vite 10

10 luglio 2015

Si attende inizio invaiatura molto precoce.

.

PERONOSPORA

Nei vigneti con macchie diffuse (ci sono!) si è osservata la ripresa della sporulazione. Per tanto essi necessitano di ancora assoluta attenzione in copertura

.

EFFETTUARE UN NUOVO TRATTAMENTO **a inizio settimana prossima**
entro massimo mercoledi 15 luglio
Sempre anticipando eventuali passaggi temporaleschi (ad oggi non previsti) che dovessero avvenire trascorsi massimo 9- 10 giorni dal precedente effettuato (a maggior ragione se ci sono macchie!)

CON PRODOTTI RAMEICI (preferibilmente solfato tribasico/ossicloruro nel caso 1- idrossidi nel caso di presenza di macchie vitali

SOLO NEL CASO di sintomi su grappolo aggiungere al rame, ancora una volta
DIMETOMORF (forum/slogan,quantum 50 wp) o miscele di altri CAA* quali
IPROVALICARB (melody compact) MANDIPROPAMID (pergado R) oppure
* (CON DIMETOMORF, IPROVALICARB, MANDIPROPAMID
(CAA MAX 4 trattai/anno nel complesso- FAMIGLIA CAA)
Oppure
METALAXIL-M + RAME (RIDOMIL GOLD R- CUMET FLOW) O BENALAXIL -RAME (GALBEN R4.33)
(max 3 trattamenti/anno con Fenilammidi metalaxil/benalaxil)

OIDIO (MAL BIANCO)/BLACK ROT***

ANCORA ATTENZIONE!
IN CASO DI ASSENZA DI BLACK ROT ADDIZIONARE ZOLFO BAGNABILE ALL'ANTIPERONOSPORICO**.**
IN CASO DI PRESENZA DI BLACK ROT RICORRERE ANCORA UNA VOLTA AD UN PRODOTTO CONTENENTE UN IBE QUALE CIPRO-DIFENO-FENBU/ PEN/PROPI/TEBU/TETRA-*conazo*lo, (MICLOBUTANIL MAX 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/ANNO. Fam IBE)
O TRIFLOXYSTROBIN**(flint) **(CON FAXOMATE, FENAMIDONE, STROBILURINE ANTIOIDICHE AZOXYSTROBIN, TRIFLOXYSTROBIN, PYRACLOSTROBIN MAX **3** TRATT/ANNO NEL COMPLESSO- FAMIGLIA QOI)

SECONDO TRATTAMENTO INSETTTICIDA OBBLIGATORIO PER FLAVESCENZA DORATA:

ATTENDERE INDICAZIONI DI DATE SPECIFICHE A INIZIO SETTIMANA PROSSIMA

ATTENZIONE A SFOGLIARE IL NEBBIOLO ORA. LA FASE è DI MASSIMA SENSIBILITà ALLE USTIONI, Già RISCONTRATE, COME SEGNALE, NEI SITI Più ESPOSTI

TUTTE LE INDICAZ.NI SUI NOMI COMMERC.LI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITà TARGET REGISTRATE E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI

nonché LA LORO ***MISCIBILITà E COMPATIBILITà SONO SEMPRE DA VERIFICARE IN ETICHETTA!!!

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITà ESCLUSIVA , ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITà TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)