



Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Bollettino Difesa Vite nr 10. 5 luglio

PERONOSPORA

Permane un **rischio molto elevato**. In presenza di macchie fogliari sporulate (bianche sotto) si ricorda che anche le bagnature notturne possono diffondere nuove infezioni secondarie.

Si consiglia di rinnovare il trattamento ENTRO GIOVEDÌ 14 luglio in anticipo sul previsto un passaggio temporalesco da domenica, su inizio settimana prossima

Utilizzando PRODOTTI DI COPERTURA RAMEICI SOTTO FORMA PREFERIBILE DI IDROSSIDO)
IN ASSOCIAZIONE A FOSETYL ALLUMINIO- O FOSFONATO DI POTASSIO (max 5 trattamenti all'anno)
O CIMOXANIL (curzate-vitene et al) (max 3 trattamenti all'anno)

NEI CASI PIÙ GRAVI, INVECE

in associazione a DIMETOMORF (forum 50 wp-feudo-quasar-slogan) O
MANDIPROPAMID (pergado sc) O
IPROVALICARB O

Tutti appartenenti alla famiglia dei CAA, assieme a VALIFENALATE, BENTHIAVALICARB. Sono penetranti. (massimo 3 trattamenti per molecola ma al massimo 4 nel complesso del gruppo. Dopo il 3° trattamento consecutivo con CAA impiegare e s.a. antiperonosporiche di diversa famiglia).

IN ALTERNATIVA INDICATA ANCHE LA MISCELA RAME+METALAXIL-M (ridomil gold r, cumeta flow et al)

(METALAXIL E BENALAXIL SONO FENILAMMIDI: CON PA DI QUESTA FAMIGLIA MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO. ATTENZIONE, METALAXIL-M è DIVERSO DAL SOLO METALAXIL COME BENALAXIL-M è DIVERSO DAL SOLO BENALAXIL. CON METALAXIL (pes MEVAXIL M) è POSSIBILE FARE SOLO 1 TRATTAMENTO ALL'ANNO

SI RICORDA: PER IL RAME LIMITARE L'APPORTO A 6 KG/RAME METALLO ALL'ETTARO.

I P.RAMEICI ne CONTENGONO IN MEDIA IL 20-25 % (ma è DA VERIFICARE in etichetta) PER CUI CON 4 KG DI PRODOTTO X SI APPORTANO MEDIAMENTE 800-1000 g di rame

OIDIO (MAL BIANCO)-BLACK ROT

ALTERNARE fungicidi a base di METRAFENONE (**massimo 3 trattamenti/anno**) oppure
CYFLUFENAMMID (**2 trattamenti/max/ anno**) oppure BUPIMIRATE (nimrod) con fungicidi della Fam. IBE
(FENBU/ PEN/ TETRA/ CIPRO/DIFENO/ PROPI-TEBU-conazolo, MICLOBUTANIL
(MAX 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/ANNO

Si consiglia di aggiungere ai suddetti prodotti, se non lo contengono già, ZOLFO BAGNABILE a dosi medie (x es. 1500-2000 g/ha).

Si ricorda l'efficacia eradicante dei trattamenti con zolfo in polvere, rinforzante a breve distanza dal trattamento

ATTENZIONE INOLTRE ALLE USTIONI. COMPLETARE LE SFOGLIATURE SU NEBBIOLO ENTRO IL 10 LUGLIO.
CONSIDERARE APPLICAZIONI A BASE DI CAOLINO E O PRODOTTI FILTRANTI GLI UV (RAYNOX PLUS)

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)