

Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Bollettino Difesa Vite nr 11. 13 luglio

PERONOSPORA

Si prospetta un periodo di tempo stabile dopo gli acquazzoni molto consistenti (e grandine) di lunedì notte SOLO nelle zone orientali (60 mm a Suno). Vista la presenza comunque diffusa di macchie sporulate (con bagnature notturne che possono ancora avviare infezioni secondarie)

**Si consiglia di rinnovare il trattamento tra
VENERDI 15 (ZONE orientali) e LUNEDI 18 luglio**

Utilizzando **PRODOTTI DI COPERTURA RAMEICI**
IN ASSOCIAZIONE A FOSETYL ALLUMINIO- O FOSFONATO DI POTASSIO (max 5 trattamenti all'anno)
O CIMOXANIL (curzate-vitene et al) (NON PIÙ DI 3 trattamenti all'anno)

NEI CASI PIÙ GRAVI, INVECE, SE NON GIÀ UTILIZZATI PER PIÙ DI 3-4 VOLTE (VEDI SOTTO)

Aggiungere DIMETOMORF (forum 50 wp-feudo-quasar-slogan) O
(Appartiene alla famiglia dei CAA con IPROVALICARB (melody), MANDIPROPAMID(pergado), assieme a VALIFENALATE , BENTHIAVALICARB . penetrant i. (massimo 3 trattamenti per molecola ma al massimo 4 nel complesso del gruppo. Dopo il 3° trattamento consecutivo con CAA impiegar e s.a antiperonosporiche di diversa famiglia).

SI RICORDA: PER IL RAME È PREVISTO L'APPORTO MASSIMO DI 6 KG/RAME METALLO ALL'ETTARO.

OIDIO (MAL BIANCO)-BLACK ROT

Proseguire l'alternanza con fungicidi a base di METRAFENONE (massimo 3 trattamenti/anno) oppure CYFLUFENAMMID (2 trattamenti/max/ anno) oppure BUPIMIRATE (nimrod)

con fungicidi della Fam. IBE (FENBU/ PEN/ TETRA/ CIPRO/DIFENO/ PROP/ TEBU-*conazole*, MICLOBUTANIL) (MAX 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/ANNO, MA CON GLI ULTIMI 5 IN GRASSETTO SOLO UNO)

Anche MICLOBUTANIL+QUINOXYFEN (arius system) (CON QUINOXYFEN MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO . VALE INOLTRE LA LIMITAZIONE SOPRA PER GLI IBE)

Si consiglia di aggiungere ai suddetti prodotti, se non lo contengono già, ZOLFO BAGNABILE a dosi medie (x es. 2500 g/ha).

Si ricorda l'efficacia eradicante dei trattamenti con zolfo in polvere, rinforzante a breve distanza dal trattamento
ATTENZIONE ALLE USTIONI. FORTI RISCONTRI DA SETTIMANA SCORSA. INTERRUMPERE LE SFOGLIATURE SU NEBBIOLO IN PARTICOLARE

FLAVESCENZA DORATA

**ATTENDERE EMISSIONE BOLLETTINO SPECIFICO INTORNO AL 20 LUGLIO CON
DATE/PRODOTTO/COMUNE . È IN CORSO IL MONITORAGGIO LOCALE DELL'INSETTO VETTORE**

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI

SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE . ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA , ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)

