



Colline Novaresi Servizio tecnico intercomunale

Bollettino Difesa Vite 12

5 agosto 2015

Si è chiuso il luglio probabilmente più caldo (ed asciutto) in assoluto della storia (da quando esistono misurazioni delle temperature). L'indice termico di Huglin, espressione diretta di tale regime termico, si posiziona su valori secondo solo al 2003. L'invaiaura è iniziata, molto precocemente, anche nei siti più tardivi di Boca sulla croatina. assoluto)

Le maturità tecnologica del Nebbiolo (sito medio) si colloca, con buona probabilità, **al massimo, negli ultimi giorni di settembre.** Quella fenolica delle uve, e quindi sulla raccolta, richiede valutazione più complesse.

PERONOSPORA

Non ci sono nuovi attacchi fogliari, salvo rare eccezioni, solo su vigneti colpiti alla fine di giugno. In ogni caso la situazione è da definirsi in generale molto buona.

Effettuare **un nuovo trattamento di copertura rameico** solo al verificarsi di nuove piogge di una certa entità (almeno 20 mm) quando siano trascorsi almeno 12-13 giorni dal precedente trattamento. In tale caso intervenire entro tre giorni dalla pioggia curando molto bene la distribuzione del prodotto sulla parte alta della vegetazione.

OIDIO (MAL BIANCO)

La difesa è da considerarsi in generale conclusa.

Si consiglia di aggiungere ZOLFO BAGNABILE come ultimo apporto solo in caso di attacchi in corso/osservati e su Nebbiolo in zone critiche.

DIRADAMENTI DEI GRAPPOLI

Si ribadisce l'opportunità di diradamenti (Su NEBBIOLO ed Erbaluce la carica produttiva è generalmente medio bassa. E' invece generalmente elevata su Vespolina.) in situazioni di stress idrico avanzato/imminente (piante giovani o zone magre del vigneto). Resta l'unico intervento possibile e consigliato di contrasto alla situazione di grave emergenza idrica (limitata a certi siti/zone vigneto) in corso.

ATTENZIONE: ALLONTANARE GLI EVENTUALI GRAPPOLI DIRADATI DAL VIGNETO-. È IL MOMENTO PEGGIORE, VISTO LA LORO COLORAZIONE, PER QUEL CHE RIGUARDA POTENZIALITÀ ATTRATTIVA

VERSO IL MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI, **DROSOPHILA SUZUKII**

(ALLEGATO ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO).

È IN CORSO UN ACCURATO MONITORAGGIO TERRITORIALE PER VALUTARE LA SUA PRESENZA/DIFFUSIONE ED EVENTUALI LINEE DI INTERVENTO. RESTANO ASSOLUTAMENTE **SCONSIGLIATI PER TUTTE LE AZIENDE INTERVENTI INSETTICIDI**

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSIÀ TARGET REGISTRATE E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI

nonché LA LORO *MISCIBILITÀ E COMPATIBILITÀ SONO SEMPRE DA VERIFICARE IN ETICHETTA!!!**

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSIÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)

IL SERVIZIO TECNICO è SOSPESO DAL 6 AL 19 AGOSTO