Cavaglio d'Agogna Suno
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Sizzano Boca
Bo gog no
Ghemme
Briona
Cressa
Fara

Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Bollettino Difesa Vite nr 15

19 agosto

Su nebbiolo la maturità tecnologica in siti medi si prospetta almeno dopo la prima decade di ottobre. Su tale vitigno, ,visto il carico produttivo generalmente elevato, è fortemente consigliato un diradamento selettivo dei grappoli

PERONOSPORA

Resta una diffusione di macchie sporulate sulle femminelle elevata. Previsto veloce passaggio temporalesco sabato 20.

Si consiglia di rinnovare il trattamento di copertura RAMEICA trascorsi 10-11 giorni dal precedente tra lunedi 22 e mercoledi 24 agosto curando bene la distribuzione verso la parte alta della vegetazione. L'intervento può essere considerato conclusivo su erbaluce e rossi precoci. Sul Nebbiolo, a seconda del regime delle piogge, probabile necessita' esecuzione ulteriore trattamento sulla parte alta a inizio settembre**.**

SI RICORDA: PER IL RAME è PREVISTO L'APPORTO MASSIMO DI 6 KG/RAME METALLO ALL'ETTARO.

OIDIO (MAL BIANCO)

Aggiungere ZOLFO BAGNABILE a dosi medie di etichetta, solo nei vigneti di Nebbiolo.

BOTRITE (MUFFA GRIGIA)

SI CONSIGLIA DI COMPLETARE LA STRATEGIA ANTIBOTRITICA INIZIATA CON IL TRATTAMENTO IN PRECHIUSURA EFFETTUANDO L'INTERVENTO A RIDOSSO DELL'INVAIATURA (FASCIA GRAPPOLI) Prodotti/date orientative:

Su vespolina, erbaluce (croatina) utilizzare prodotti con carenza 21 gg ENTRO IL 29/8 .

Su nebbiolo TRATTAMENTO IN FASCIA GRAPPOLI (POST SFOGLIATURA/DIRADAMENTO)

ENTRO 10 SETTEMBRE CON PRODOTTI AVENTI 21 GG DI CARENZA,

%% PIRIMETANIL(SCALA) %% CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) (o anche da soli)**(21 GG)**

******* FENPYRAZAMINE (PROLECTUS) **(14 GG CARENZA,** entro 15 settembre**)**

NB NEL CASO SI SIA ESEGUITO Già UN TRAT.TO SPECIFICO IN PRECHIUSURA UTILIZZARE UN PRODOTTO DI DIVERSA FAMIGLIA CHIMICA (RIF: %% O *) x es NO SCALA SE GIA UTILIZZATO SWITCH. IN TAL CASO UTILIZZARE (PROLECTUS***)**

CONTRO LA BOTRITE SONO AMMESSI DUE TRATTAMENTI FUNGICIDI CHIMICI /ANNO MAX

IN AGGIUNTA, **IN CASO DI ANDAMENTO METEO CRITICO**, IN PROSSIMITà DELLA VENDEMMIA, SI POSSONO UTILIZZARE I SEGUENTI PRODOTTI "BIOLOGICI" COADIUVANTI CON CARENZE BREVISSIME (IN PARENTESI)

BICARBONATO DI POTASSIO:ARMICARB: 1GG). BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS(AMILO-X:3GG), BACILLUS SUBTILIS (SERENADE MAX: 3 GG); ESTRATTI NATURALI E MICROELEMENTI (BOTRISINE.NP)

Il servizio tecnico è sospeso fino al 29.08

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITà VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITà ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITà TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)