


Cavaglio d'Agogna Sino
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Sizzano Boca
Bogogno
Ghemme
Briona
Cressa
Fara

Servizio tecnico Alto Piemonte

Bollettino Difesa Vite nr 4

03 maggio 2016

PERONOSPORA

Attese piogge consistenti da sabato 7 per tutta la settimana prossima

SI CONSIGLIA DI POSIZIONARE IL PRIMO TRATTAMENTO tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio

Attenzione! intervenire prima sarebbe tecnicamente sbagliato.

.Si consigliano i seguenti prodotti di copertura, con buona resistenza al dilavamento

METIRAM(polyram df) METIRAM+AMETOCTRADINA(enervin/slogan Top)

PROPINEB(antracol)

MANCOZEB (di seguito indicato con MZ o M) (crittox mz 80, Aspor z, m70df, zm 75 , et altri)

Oppure DITANON (delan 70 wg) O FOLPET (folpan ecc)

CON I PRODOTTI IN QUESTO GRUPPO, DA SOLI O IN MISCELA, NON SUPERARE I 3-4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI E SOPRATTUTTO NON USARLI DOPO L'ALLEGAGIONE (15/6)

Con aggiunta di UN seguente s.a (Esistono anche formulazioni già pronte di tali miscele)

DIMETOMORF (forum 50 wp-feudo-quasar) O

MANDIPROPAMID (pergado sc) O

IPROVALICARB O

VALIFENALATE (valis M/F).

Tutti appartenenti alla famiglia dei CAA, penetranti. EFFETTUARE massimo 3 trattamenti per s.a, ma al massimo 4 nel complesso del gruppo. Dopo il 3° trattamento consecutivo con CAA impiegare s.a diversa, di diversa famiglia)

O CIMOXANIL (curzate-vitene et al) (max 3 trattamenti all'anno)

Indicare anche la miscela METIRAM+AMETOCTRADINA(enervin/slogan Top)

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO- E PREVISTO IN ETICHETTA-SI RICORDA IN GENERALE DI NON EFFETTUARE PIÙ DI 3 TRATTAMENTI/ANNO CON OGNUNA DELLE S.A INDICATE OPPURE NEL COMPLESSO DEL GRUPPO/FAMIGLIA SE LE S.A HANNO STESSA APPARTENENZA (VEDI CAA)

OIDIO (MAL BIANCO):

VIGNETI A RISCHIO : aggiungere dosi medio alte di ZOLFO BAGNABILE ((tipo 1500-2000 grammi/ettaro).

Oppure la miscela PIRACLOSTROBIN+METIRAM (cabrio top) utile per l'apertura dei trattamenti, avendo polivalenza contro l'escoriosi, la peronospora e l'oidio, (gruppo Qoi: pyraclostrobin+trifloxystrobin+azoxystrobin max 3 trattamenti+fenamidone max 1 trattamento)all'anno ma massimo 4 complessivamente)

oppure

SPIROXAMINA (prosper 300 sc,-veliero) (non più di 2 trattamenti a dosi crescenti)

VIGNETI A BASSO RISCHIO aggiungere

ZOLFO BAGNABILE a dosi più ridotte (x es. 1000 grammi/ha).

RISPARMIATE PRODOTTO: PER il primo trattamento utilizzare una dose/ha RIDOTTA ALMENO DEL 30% Per es: prodotto a 400g/hl = 4 kg/ha si potrà usare a 3,0 kg/ha NEL PRIMO TRATTAMENTO Indipendentemente dal volume d'acqua(ridotto) utilizzato per trattare

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)