

Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Bollettino Difesa Vite nr 5

16 maggio 2016

PERONOSPORA

Si consiglia di eseguire il secondo trattamento
entro martedì 17 maggio (max mercoledì 18 mattina)

Utilizzando preferibilmente il seguente PRINCIPIO ATTIVO (PA):
ZOXAMIDE (ZOXIUM 240 SC) (max 4 trattamenti/anno con zomxamide)

Oppure altri PA di copertura, con buona resistenza al dilavamento

METIRAM(polyram df) METIRAM+AMETOCTRADINA(enervin/slogan Top) (max 3 trattamenti/anno con Ametoctradina)
PROPINEB(antracol)

MANCOZEB (di seguito indicato con MZ o M) (crittox mz 80, Aspor z, m70df, zm 75, et altri)

Tutti nel Gruppo DITIOCARBAMMATI (utilizzo massimo allegazione o 30/6)

Oppure DITIANON (delan 70 wg) O FOLPET (folpan ecc) (3 trattamenti al massimo per Mancozeb, dithianon, folpet, fluazinam ma 4 nel complesso tra loro)

Con aggiunta di un seguente PA (esistono anche formulazioni già pronte di queste miscele)

DIMETOMORF (forum 50 wp-feudo-quasar-slogan) O

MANDIPROPAMID (pergado sc) O

IPROVALICARB O

VALIFENALATE (valis M/F)

BENTIHIIVALICARB(vincare)

Tutti appartenenti alla famiglia dei CAA, penetranti. (massimo 3 trattamenti per molecola ma al massimo 4 nel complesso del gruppo.

Dopo il 3° trattamento consecutivo con CAA impiegare s.a antiperonosporiche di diversa famiglia)

O CIMOXANIL (curzate-vitene et al) (max 3 trattamenti all'anno)

Indicata anche la miscela METIRAM+AMETOCTRADINA(enervin/slogan Top) (max 3 trattamenti/anno con Ametoctradina)

OIDIO (MAL BIANCO):

VIGNETI A RISCHIO : aggiungere dosi medio alte di ZOLFO BAGNABILE ((tipo 2000 grammi/ettaro).

oppure

SPIROXAMINA (prosper 300 sc,-veliero) (non più di 2 trattamenti a dosi crescenti) (max 3 trattamenti/anno)

VIGNETI A BASSO RISCHIO aggiungere

ZOLFO BAGNABILE a dosi più ridotte (x es. 1500 grammi/ha).

FERTILIZZANTI FOGLIARI: DA ORA PER 3 TRATTAMENTI AGGIUGERE FOGLIARI CONTENENTI BORO

Per il secondo trattamento possibile utilizzare una dose/ha RIDOTTA ALMENO DEL 20%

Per es: prodotto a 400g/hl = 4 kg/ha si potrà usare a 3,2 kg/ha NEL SECONDO TRATTAMENTO

Indipendentemente dal volume d'acqua(ridotto) utilizzato per trattare

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)