



# Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

## Bollettino Difesa Vite nr 6

### 25 maggio 2016

#### PERONOSPORA

Si consiglia di eseguire il terzo trattamento  
Tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio

Nebbiolo in imminente inizio fioritura nei siti più precoci.

Utilizzando, a scelta, uno dei seguenti prodotti rispettando i consigli limitativi riportati tra parentesi in grassetto

AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI K(enervin pro)  
(CON AMETOCTRADINA MAX 3 TRATTAMENTI/ANNO)  
FLUOPICOLIDE+PROPINEB (R6 pasadoble)  
(CON FLUOPICOLIDE MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO)

METALAXIL-M+MaNCOZEB/FOLPET (ridomil gold mz et al oppure) BENALAXIL-M+MZ O + FOLPET (fantic M o fantic F)

Oppure MANCOZEB +FOSETIL-AL+CIMOXANIL (arpel triplo blu)

(METALAXIL E BENALAXIL SONO FENILAMMIDI: CON PA DI QUESTA FAMIGLIA MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO.  
PER I DITIOCARBAMMATI : MANCOZEB, METIRAM, PROPINEB INOLTRE utilizzo massimo FINO allegazione o entro 20/6

SI RICORDA CHE IN LINEA DI MASSIMA- TRA LA FINE DI UN TRATTAMENTO E L'INIZIO DI UNA EVENTUALE PIOGGIA,  
DEVONO PASSARE ALMENO 2-3 ORE., DIVERSAMENTE È BUONA NORMA "RIBATTERLO"....

#### OIDIO (MAL BIANCO)/ BLACK ROT

Associare prodotti contenuti nella Fam. IBE (FENBU/ PEN/ TETRA/ CIPRO/DIFENO/ PROPI/-TEBU-conazolo, MICLOBUTANIL  
(MAX 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/ANNO)

Anche MICLOBUTANIL+QUINOXYFEN (arius system) (CON QUINOXYFEN MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO)

Si consiglia di aggiungere ai suddetti prodotti, se non lo contengono già, ZOLFO BAGNABILE a dosi medie ( x es. 1500-2000 g/ha).

#### FERTILIZZANTI FOGLIARI:

Già consigliata dal precedente e **PER I PROSSIMI 2 TRATTAMENTI**, L'AGGIUNTA DI PRODOTTI **CONTENENTI ESCLUSIVAMENTE BORO**, IMPORTANTE NELLA FUTURA FASE DELLA FIORITURA/ALLEGAGIONE.  
VERIFICARE LA MISCIBILITÀ CON I PRODOTTI ANTIPARASSITARI CONSIGLIATI (fosetil in particolare) IN ETICHETTA

#### INTERVENTI IN VERDE

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LA PRIMA CIMATURA PRECOCEMENTE, NELL'IMMEDIATO POST- FIORITURA (5-10 GIUGNO),  
IN PARTICOLARE SU NEBBIOLO NEI VIGNETI PIÙ VIGORSI. STESSO DICASI PER UN PRIMO INTERVENTO DI SFOGLIATURA  
ZONA GRAPPOLI DA ATTUARE SUL LATO FILARE MENO ESPOSTO (A NORD OPPURE AD EST, A SECONDA DEL LORO  
ORIENTAMENTO).

**TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.**

**INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)**