



Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Bollettino Difesa Vite nr 7

3 giugno 2016

PERONOSPORA

ATTENZIONE FASE CRITICA. RISCONTRI FREQUENTI. FASE TEMPORALESCA ATTUALMENTE PREVISTA. ACCENTUAZIONE FINO A MERCOLEDÌ

RIPETERE il precedente trattamento

APPENA POSSIBILE, TRASCORSI 9-10 GIORNI DAL PRECEDENTE (ENTRO DOMENICA 5?) facendo attenzione

evoluzione nelle previsioni locali e di "finestre" di assenza di precipitazione che si apriranno

SI RICORDA CHE IN LINEA DI MASSIMA- TRA LA FINE DI UN TRATTAMENTO E L'INIZIO DI UNA EVENTUALE PIOGGIA

DEVONO PASSARE ALMENO 2-3 ORE., DIVERSAMENTE è BUONA NORMA "RIBATTERLO"....

Utilizzare preferibilmente lo stesso prodotto/i indicato nel precedente bollettino a scelta tra (rispettando le limitazioni d'uso riportate nelle avvertenze e nei foglietti illustrativi)

AMETOCTRADINA+FOSFONATO DI K(enervin pro)
(CON AMETOCTRADINA MAX 3 TRATTAMENTI/ANNO)
FLUOPICOLIDE+PROPINEB (R6 pasadoble)
(CON FLUOPICOLIDE MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO)

METALAXIL-M+MANCOZEB/FOLPET (ridomil gold mz et al oppure) BENALAXIL-M+MZ O + FOLPET (fantic M o fantic F)

Oppure MANCOZEB +FOSETIL-AL+CIMOXANIL (arpel triplo blu)

(METALAXIL E BENALAXIL SONO FENILAMMIDI: CON PA DI QUESTA FAMIGLIA MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO. ATTENZIONE, METALAXIL-M è DIVERSO DAL SOLO METALAXIL COME BENALAXIL-M è DIVERSO DAL SOLO BENALAXIL.)

CON METALAXIL (pes MEVAXIL M) è POSSIBILE FARE SOLO 1 TRATTAMENTO ALL'ANNO
(3 trattamenti al massimo per mancozeb, dithianon, folpet, fluazinam ma 4 nel complesso tra loro) PER I DITIOCARBAMMATI: MANCOZEB, METIRAM, PROPINEB INOLTRE (utilizzo massimo FINO allegazione o 30/6)

OIDIO (MAL BIANCO) E SOPRATTUTTO ATTENZIONE AL BLACK ROT

I RISCONTRI (MACCHIE) DI QUESTO PATOGENO SONO ELEVATI, L'ANDAMENTO TEMPORALESCO è PREDISPOSENTE

Associare prodotti ad azione collaterale,

contenuti nella Fam. IBE (FENBU/ PEN/ TETRA/ CIPRO/DIFENO/ PROPI/-TEBU-conazolo, MICLOBUTANIL
(MAX 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/ANNO, MA CON GLI ULTIMI 5 IN GRASSETTO SOLO UNO)

Anche MICLOBUTANIL+QUINOXYFEN (arius system) (CON QUINOXYFEN MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO)

Si consiglia di aggiungere ai suddetti prodotti, se non lo contengono già, ZOLFO BAGNABILE a dosi medie (x es. 1500-2000 g/ha).

Oppure TRIFLOXYSTROBIN (flint) (appartiene al gruppo QOI assieme a FENAMIDONE, FAMOXADONE, PYRACLOSTROBIN, AZOXYSTROBIN 3 trattamenti/max anno nel complesso. Con Famoxadone un solo trattamento/anno)

FERTILIZZANTI FOGLIARI:

ULTIMO DEI 2/3 TRATTAMENTI CONSIGLIATI APPORTANTI **ESCLUSIVAMENTE BORO**, VERIFICARE LA MISCIBILITÀ CON I PRODOTTI ANTIPARASSITARI CONSIGLIATI (fosetil in particolare) IN ETICHETTA

INTERVENTI IN VERDE

GIÀ CONSIGLIATA: CIMATURA PRECOCE, NELL'IMMEDIATO POST-FIORITURA IN PARTICOLARE SU NEBBIOLO .IDEM PRIMO INTERVENTO DI SFOGLIATURA ZONA GRAPPOLI DA ATTUARE SUL LATO FILARE MENO ESPOSTO (A NORD OPPURE AD EST)

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE E INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA. ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)