



Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Bollettino Difesa Vite nr 9

27 giugno 2016

PERONOSPORA

Progressione diffusa dei sintomi su foglie/grappoli nel fine settimana. Da mercoledì sera è prevista una nuova fase temporalesca che va sicuramente anticipata con un

nuovo trattamento ENTRO MERCOLEDÌ 29.6.16

Utilizzando PRODOTTI DI COPERTURA RAMEICI+ ZOAXAMIDE (4 TRATTAMENTI MAX/ANNO) O in associazione a FOSETIL-ALLUMINIO OPPURE FOSFONATO DI POTASSIO

IN ALTERNATIVA INDICATA ANCHE LA MISCELA RAME+METALAXIL-M (ridomil gold r, cumeta flow et al)

(METALAXIL (m) E BENALAXIL (m) SONO FENILAMMIDI: CON PA DI QUESTA FAMIGLIA MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO.

SI RICORDA:

PER IL RAME è consigliato L'APPORTO MASSIMO DI 6 KG/RAME METALLO ALL'ETTARO. I P.RAMEICI ne CONTENGONO IN MEDIA IL 20-25 % (ma è DA VERIFICARE in etichetta) PER CUI CON 4 KG DI PRODOTTO X SI APPORTANO MEDIAMENTE 800-1000 g di rame

OIDIO (MAL BIANCO)-MUFFA GRIGIA

Si segnalano anche riscontri di oidio, su nebbiolo in particolare

Si consiglia ora l'alternanza con fungicidi a base di METRAFENONE (massimo 3 trattamenti/anno) oppure CYFLUFENAMMID (2 trattamenti/max/ anno) oppure BUPIMIRATE (nimrod)

Si ricorda l'efficacia eradicante dei trattamenti con zolfo in polvere, rinforzante a breve distanza dal trattamento

L'intervento CONTRO LA MUFFA GRIGIA IN PRECHIUSURA GRAPPOLO (IMMINENTE SU NEBBIOLO NELLE ZONE Più PRECOCI) è fondamentale in caso prosegua l'andamento meteo attualmente predisponente. Nei vigneti più soggetti pertanto si consiglia di impiegare **in alternativa:**

BOSCALID (cantus) (p.a. con bivalenza oidio/muffa grigia) (1 trattamento max/anno)

oppure gli specifici antibotritici (fascia grappoli)

FENEXAMIDE (teldor plus) oppure FENPYRAZAMIN (prolectus) (entrambi max 1 tratt./anno)

Si ricorda la complementarietà assoluta dell' esecuzione corretta ed in tempo di INTERVENTI IN VERDE (cimatura e sfogliatura) nel buon esito della difesa, oltretutto ad influenze positive sulla qualità' (nebbiolo in particolare)

ATTENZIONE INOLTRE ALLE USTIONI. L'ANNATA è PREDISponente COME segnalato. NON EFFETTUARE SFOGLIATURE TARDIVE ED IMPROVVISE SU NEBBIOLO OLTRE INIZIO LUGLIO.

A TAL PROPOSITO SI CONSIGLIA DI CONSIDERARE, ALMENO SU NEBBIOLO E SUL LATO Più ESPOSTO (SUD E OVEST, APPLICAZIONI A BASE DI CAOLINO E O PRODOTTI FILTRANTI GLI UV (RAYNOX PLUS)

**FLAVESCENZA DORATA ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL BOLLETTINO SPECIFICO
IN LINEA DI MASSIMA L'INTERVENTO INSETTICIDA è COMPATIBILE CON LA BAGNATURA, SALVO
AUMENTO DEI VOLUMI DI ACQUA AD ETTARO AD ALMENO 5-600 L**

TUTTE LE INDICAZIONI SUI NOMI COMMERCIALI DEI PRODOTTI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSItà VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI

SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSItà TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)