

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

6

6 giu 25

SITUAZIONE

CONFERMATO IL RAPIDO DECORSO DELLA FIORITURA CON VIGNETI DI NEBBIOLO ANCHE MEDI ORA GIÀ IN FASE DI GRANO PEPE. GLI APPORTI PIOVOSI DELLA SETTIMANA, CON LA RIPRESA DELLA INSTABILITÀ DA LUNEDÌ, SONO STATI DECISAMENTE PIÙ CONSISTENTI NELLE ZONE SETTENTRIONALI DELLE NOSTRE COLLINE. DOPO LIEVE INSTABILITÀ PREVISTA (SEPPUR IN CALO) ANCORA PER ALCUNI GIORNI, SI PROSPETTA UN LUNGO PERIODO DI BEL TEMPO FINO A METÀ MESE CON TEMPERATURE IN CRESCENDO FIN VERSO I 30 °C.

PERONOSPORA

RISCHIO

SEGNALATI LIEVI RISCONTRI DI NUOVE MACCHIE D'OLIO DEL FUNGO E SPORADICI I ATTACCHI SU INFIORESCENZE. PROBABILMENTE LEGATI A COPERTURE INCOMPLETE SU PIOGGE (INASPETTATE) DI INIZIO-METÀ SETTIMANA SCORSA

SI CONSIGLIA DI RIPETERE IL TRATTAMENTO

TRA
E
DOMENICA 8
MARTEDÌ 10 GIUGNO

UTILIZZANDO

LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE IN FORMAZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIÀ LE CONTENGONO
NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX CONSIGLIATO DI TRATT./TI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMITE= SL

*****FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE)), FLUAZINAM(3), FOLPET(SENZA LIMITE).**

E PREFERIBILMENTE TRA ESSI FLUAZINAM)

IN MISCELA CON

*****FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3) : BENALAXYL-M (3),METALAXYL-M (3). METALAXIL REINTRODOTTO (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)**

*****OXATHIPIPROLIN*** (2MAX SEMPRE IN MISCELA)**

SEMPRE IN ASSOCIAZIONE CON

*****FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).**

O IN FINE .E MISCELE COMMERCIALI DI

***** ZOAXAMIDE*** (4) OPPURE ***AMETOCTRADINA***(QoSi) (3) .**

OIDIO E BLACK ROT (MARCUME NERO)

RISCHIO

LIEVE INCREMENTO NEI RISCONTRI DI SINTOMI FOGLIARI DI BLACK ROT. SI RICORDA CHE LA FASE FENOLOGICA A CAVALLO DELLA FIORITURA/INIZIO ALLEGAGIONE E' DI ESTREMA SENSIBILITÀ PER ATTACCHI SUI GRAPPOLI.

ASSOCIARE ALL'ANTIPERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA

*****FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTER.TIVA)**

OPPURE

*****FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO ANCHE ASSIEME A ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN(3) : AZOXY%%(2)/TRIFLOXY-STROBYN**

O IN FINE

*****FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : FLUXAPYROXAD(2)**

NB %%AZOXYSTROBYN E' PARTICOLARMENTE INDICATO IN QUESTA FASE PER PARZIALE MA ESTESA EFFICACIA COLLATERALE

AVENDO CURA DI ESEGUIRE, PREFERIB. TE, -SE POSSIBILE RIPETERLI- AL MASSIMO 2 TRATTAMENTI DI SEGUITO CON LO STESSO PRINCIPIO ATTIVO ESEMPIO DI SEQUENZE CORRETTE: IBE-IBE-STROBILURINA-IBE OPPURE; STROBILURINA-IBE-STROBILURINA-IBE. ASSOCIARE SEMPRE UNA DOSE COMPLEMENTARE DI ZOLFO BAGNABILE IN COPERTURA SE NON GIÀ PRESENTE NEL PRODOTTO

TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER FLAVESCENZA DORATA EFFICACE ANCHE CONTRO POPILLIA JAPONICA

ATTENDERE! NON È ANCORA IL MOMENTO! LE INFORMAZIONI/DATE SPECIFICHE SARANNO DIVULGATE NEI PROSSIMI BOLLETTINI

Principali segnalazioni di riscontro del coleottero giapponese. La situazione è sotto attenta valutazione e sarà valutata con il Servizio Fitosanitario Regionale

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI, SUI PRINCIPI ATTIVI, AVVERSIITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI, - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE, INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO, OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSIITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).