

6

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

28 mag 24

SITUAZIONE

I temporali di settimana scorsa hanno determinato apporti di pioggia, nel complesso, molto più contenuti di quanto ipotizzato dalle previsioni. Fioritura in esordio (con progressione lenta) solo sui Nebbioli delle zone più precoci (con primissimi riscontri da metà/fine settimana scorsa). Solo in lievissimo ritardo rispetto all'anno scorso, mentre mantiene un minimo anticipo sulla media, nonostante tutto. Attività temporalesca prevista in accentuazione negli ultimi giorni della settimana

PERONOSPORA

RISCHIO

LA PROGRESSIONE DELLA SINTOMATOLOGIA IN VIGNETI 'SPIA' (TESTIMONI O NON ADEGUATAMENTE TRATTATI O CON TEMPESTICHE NON CONSONE ALLE FREQUENZE RICHIESTE), SI E' MOSTRATA NEGLI ULTIMI GIORNI IN NETTA EVOLUZIONE PEGGIORATIVA. PRIMI RISCONTRI DI ATTACCHI ALLE INFIORESCENZE

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO ENTRO GIOVEDÌ 3 O MAGGIO MATTINA

IN ANTICIPO SUL PASSAGGIO TEMPORALESCO PREVISTO DALLA SERATA DEL 30.5

UTILIZZANDO

LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE IN FORMAZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIÀ LE CONTENGONO

NB: TRA PARENTESI IL NUMERO MAX CONSIGLIATO DI TRATT./TI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A) SPECIFICA. SENZA LIMITE SL

***FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM(4), FOLPET(4).

CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

****DATA L'ECCEZIONALITA' DELLE PIOGGE DI QUEST'ANNO E' POSSIBILE AUMENTARE IL LIMITE MASSIMO DI TRATTAMENTI DI

IN MISCELA CON

***FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3): BENALAXYL-M (3), METALAXYL-M (3), METALAXIL REINTRODOTTO (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)

E/O

***FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).

OPPURE

***FAMIGLIA/GRUPPO: QII (3): CIAZOFAMIDE (3), AMISULBROM (3, MA NON PIÙ DI 2 CONSECUTIVI SE USATO DA SOLO)

O IN FINE

ALTRE S.A "SINGOLE"

ZOXAMIDE (4)

AMETOCTRADINA (QoSi) (3).

OXATHIAPROLIN (2MAX SEMPRE IN /

FLUOPICOLIDE (2)
2 MAX CON METALAXIL

OIDIO (MAL BIANCO)

RISCHIO

PROSEGUE CONTENUTO IL RISCONTRO DI SINTOMI FOGLIARI DEL PATOGENO. MA ATTENZIONE... E' IN AUMENTO QUELLO DI BLACK ROT E NON COSÌ INFREQUENTI I SINTOMI DI MUFFA GRIGIA (BOTRITE)

ASSOCIARE ALL'ANTIPERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA

***FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO ANCHE ASSIEME A ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN(3): AZOXY (2)/TRIFLOXY-STROBYN

***CIFLUFENAMID(2 T/MAX)

O

***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO): MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTER.TIVA)

***FAMIGLIA/GRUPPO: "CMR" (2 TRATT. TOTALI /MAX/ANNO): PROQUINAZID (2), BUPIMIRATE (2), PYRIFENONE(%) (2)

***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI:

Da usare in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai 'tradizionali'. Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/avversità.

ALTRI CONSIGLI TECNICI

VALUTARE IL RICORSO A FERTILIZZANTI FOGLIARI A BASE DI ALGHE/MICROELEMENTI (BORO) IN SUPPORTO ALLA FIORITURA

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSAITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSAITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).