



Servizio tecnico Colline novaresi

MESSAGGIO NR 10 DEL 20/06/14

NEBBIOLO NEI SITI PRECOCI IN PRE CHIUSURA GRAPPOLO.

PERONOSPORA-

ATTENZIONE NEI TESTIMONI NON TRATTATI ED IN VIGNETI NON BEN COPERTI TRA FINE MAGGIO E INIZIO GIUGNO SI È RICONTRA OGGI UNA CERTA DIFFUSIONE DI MACCHIE D'OLIO DI PERONOSPORA. MONITORARE ATTENTAMENTE IL PROPRIO VIGNETO

ATTUALMENTE SUL FINE SETTIMANA PROSSIMA, A PARTIRE DA GIOVEDÌ 26 È PREVISTO UN INTENSO E PROLUNGATO PASSAGGIO PERTURBATO CHE VA ASSOLUTAMENTE ANTICIPATO CON UN

NUOVO TRATTAMENTO TRA MARTEDÌ 24 E MERCOLEDÌ 25 (MATTINA)*

PRODOTTI DA CONSIGLIATI

RAMEICI PREFERIBILMENTE COME OSSICLORURI (PASTA CAFFARO, CUPRAVIT, NEORAM ET ALTRI O SOLFATO TRIBASICO (Cuproxat sdi, curavit bio evolution, RAIDER 3B, king et altri) IN ASSOCIAZIONE (ANTIDILAVAMENTO) A UNO DEI SEGUENTI PA DELLA FAMIGLIA DEI CAA /DIMETORF/ IPROVALICARB / MANDIPROPAMID

ALCUNI ESEMPI (FORUM WP/ FEUDO /QUASAR/PERGADO SC DA AGGIUNGERE AL RAME, ALTRI GIÀ FORMULATI : FORUM R, SLOGAN R MELODY COMPACT ,POSITRON R, PERGADO R con

LIMITI GIÀ CONSIGLIATI A TUTTI I VITICOLTORI

MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO: nel complesso per le molecole sopraindicate appartenenti alla famiglia dei CAA. MA Non più di 3 per la singola molecola. Il QUARTO eventuale trattamento, con molecola diversa, deve essere intervallato da trattamento con molecola appartenente a famiglia diversa **OPPURE**

ZOXAMIDE+RAME (ZEMIX R, ELECTIS R) (MASSIMO 4 TRATTAMENTI)

CIAZOFAMIDE (MILDICUT) (MAX 3 TRATTAMENTI NEL COMPLESSO CON AMISULBRON)

OVVERO RAME+ FOSETYL AL +CIMOANIL (VITENE TRIPLO R)

***LUNEDÌ 23 ATTUALMENTE È DATO PER PIOVOSO. L'ANTICIPO DEL TRATTAMENTO A DOMENICA 22 È **SCONSIGLIATO** MA SE INEVITABILE IN QUESTO CASO MEGLIO UTILIZZARE FLUOPICOLIDE + FOSETYL AL (R6 ALBIS)**

OIDIO.BOTRITE

ATTENZIONE SU NEBBIOLO NEI TESTIMONI NON TRATTATI L'EVOLUZIONE DELLA MALATTIA IN CAMPO È DISCRETA.

VISTA LA FASE DI PRE-CHIUSURA GRAPPOLO I PRODOTTI PIÙ INDICATI SONO

BOSCALID (cantus/filan), O FLUOPIRAM (luna privilege) che si possono usare una sola volta alternativamente tra loro

Essendo entrambi dotati ENTRAMBI di SPICCATATA ATTIVITÀ ANTIBOTRITICA

IN ALTERNATIVA ALTRI PRODOTTI DI LUNGA PERSISTENZA QUALI **METRAFENONE (vivando), , BUPIMIRATE (nimrod),**

QUINOXYFEN singolo (ARIUS) : **CIFLUFENAMID (rebel top/cidely):** COI QUALI EFFETTUARE MASSIMO 2 TRATTAMENTI DI FILA OPPURE A SCELTA TRA

i 3 QOI: TRYFLOXYSTROBIN (flint) AZOXYSTROBIN (quadris) PIRACLOSTROBIN (tucana) (MAX 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI) ANCH'ESSI CON DISCRETA ATTIVITÀ COLLATERALE ANTIBOTRITICA

TRATTAMENTO INSETTICIDA AL VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA:

LE DATE X COMUNE X INSETTICIDA SONO STATE DIFFUSE

IL TRATTAMENTO È COMPATIBILE ("SI PUÒ AGGIUNGERE") CON QUELLO FUNGICIDA SOPRA INDICATO, CON L'AVVERTENZA DI ADEGUARE I VOLUMI DI ACQUA USATI ALMENO A 5-700 LITRI/HA COME INDICATO IL FORTE PASSAGGIO PERTURBATO SUINDICATO DA GIOVEDÌ (ORA INDICATI ANCHE 70 MM) COMPORTA QUESTA DI CONSIDERARE L'ELEVATO RISCHIO DI DILAVAMENTO! **PER CUI IL CONSIGLIO PRATICO È IL SEGUENTE:**

INSETTICIDA PREPIOGGE DI GIOVEDÌ 26.65: INDICATO THIAMETOXAM (ACTARA) ESSENDO DOTATO DI PROPRIETÀ SISTEMICHE (PENETRANTE)

SE SI OPTA PER L'UTILIZZO DI FOSFORGANICI MEGLIO DEDICARE UN TRATTAMENTO APPOSITO POSTICIPATO DOPO IL FORTE PASSAGGIO PERTURBATO DESCRITTO.

Si ricorda

In base alla L. R. n. 20 del 3/8/98- salvaguardia delle api e degli altri insetti pronubi il trattamento insetticida deve essere effettuato solo ad allegazione avvenuta, **previa l'eliminazione, tramite sfalcio e appassimento o asportazione, di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti.** Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva

Ulteriori complete indicazioni e quadro tecnico/legislativo/sanzionatorio su

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/flavescenza.htm