



Servizio tecnico Colline novaresi

MESSAGGIO NR 11 DEL 27/06/14

NEBBIOLO IN SITI MEDI. IMMINENTE CHIUSURA GRAPPOLO.

PERONOSPORA

MOLTA ATTENZIONE. I RIPETUTI EVENTI TEMPORALESCHI INTENSI, CHE HANNO PURTROPPO CAUSATO FORTISSIMI DANNI, ANCHE TOTALI, A MEZZOMERICO E MARANO TICINO SONO DESTINATI, SU PREVISIONE ATTUALE, A PERDURARE CON INTERMITTENZA FINO A DOMENICA(IN INTENSIFICAZIONE) E, DOPO BREVE PAUSA SOLEGGIATA LUNEDI, A RIPRENDERSI DA MARTEDI

FONDAMENTALE PERTANTO RIPRISTINARE LA COPERTURA RAMEICA NELLA FINESTRA DI
(DOMENICA POMERIGGIO?) **LUNEDI 30.6 –MARTEDI 1 LUGLIO (MATTINA)**

PRODOTTI DA CONSIGLIATI

RAMEICI PREFERIBILMENTE COME OSSICLORURI (PASTA CAFFARO, CUPRAVIT, NEORAM ET ALTRI
O SOLFATO TRIBASICO(Cuproxat sdi, curavit bio evolution, RAIDER 3B, king et altri)

OPPURE

ZOXAMIDE+RAME (ZEMIX R, ELECTIS R) (MASSIMO 4 TRATTAMENTI)

OVVERO RAME+ FOSETYL AL +CIMOCHANIL (VITENE TRIPLO R)

L'INTERVENTO CON PRODOTTI RAMEICI MOLTO VICINO (POSSIBILMENTE ENTRO 12 ORE.max24) AD UN EVENTO GRANDINIGENO è STATO CONSIGLIATO AI VITICOLTORI DEI COMUNI COLPITI SOPRA E RESTA UN ACCORGIMENTO FONDAMENTALE DI DISINFEZIONE AD AMPIO SPETTRO PER EVITAR L'INSEDIAMENTO DI PATOGENI TIPICI DA FERITA (TIPO CARIE BIANCA)

OIDIO.BOTRITE

SONO STATI Già INDICATI, IN ABBINAMENTO AI RAMEICI CON FUNZIONE ANTIBOTRITICA (SOPRATTUTTO IN CASO DI GRANDINE) E VISTA LA FASE CRITICA DI PRECHIUSURA GRAPPOLO (ANCORA DA RAGGIUNGERE IN VARIETÀ DIVERSE DAL NEBBIOLO E-SU ESSO- IN TUTTI I SITI MENO PRECOCI.

BOSCALID (cantus/filan), O FLUOPIRAM (luna privilege) DA usare una sola volta alternativamente tra loro

SE Già EFFETTUATO L'ULTIMO TRATTAMENTO CON ESSI

RICORRERE A ZOLFO BAGNABILE

PRIMO

TRATTAMENTO INSETTICIDA AL VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA:

PROCEDERE NELLE DATE X COMUNE X INSETTICIDA DIFFUSE CON APPOSITO

QUADRO

Si ricorda

In base alla L. R. n. 20 del 3/8/98- salvaguardia delle api e degli altri insetti pronubi il trattamento insetticida deve essere effettuato solo ad allegazione avvenuta, **previa l'eliminazione, tramite sfalcio e appassimento o asportazione, di eventuali fioriture spontanee nella vegetazione sottostante le viti.** Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva

Ulteriori complete indicazioni e quadro tecnico/legislativo/sanzionatorio su

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/flavescenza.htm