



Servizio tecnico Colline novaresi

MESSAGGIO NR 15 DEL 31/07/14

NELLA NOTTE DI LUNEDI/MARTEDI 28-29 LUGLIO SONO CADUTI PIÙ DI 50 MM DI ACQUA. PIOGGE CONSISTENTI NUOVAMENTE PREVISTE DA DOMANI SERA PER TUTTO IL WEEKEND, nonché INSTABILITÀ PERDURANTE PROSPETTATA PER LA PRIMA DECADE DI AGOSTO

PERONOSPORA.

RESTA CONSIGLIATO

RIPRISTINARE LA COPERTURA

DEI VIGNETI CON TURNI RACCORCIATI SECONDO UN CRITERIO CAUTELATIVO A 5-7 GIORNI SE SI USANO RAMEICI, A 7-9 IN CASO DI PRODOTTI 'PENETRANTI'. ALMENO NEI VIGNETI PIÙ COLPITI DUNQUE

**TRA OGGI E DOMANI VENERDI 1 AGOSTO
O COMUNQUE APPENA POSSIBILE**

VISTA IL PERICOLO DI NUOVE INFEZIONI FOGLIARI INNESCAE, IN PRESENZA DI MACCHIE, ANCHE SOLO DALLE ABBONDANTI RUGIADE NOTTURNE

SONO CONSIGLIATI PRODOTTI RAMEICI PREFERIBILMENTE SOTTO FORME A MAGGIOR PERSISTENZA E A DOSAGGIO/ETTARO MOLTO ELEVATO (CONSULTARE L' ETICHETTA)

NEI CASI PIÙ CRITICI LE FENILAMMIDI METALAXIL.M/ BENALAXIL + RAME (RIDOMIL GOLD R-CUMETA FLOW /GALBEN R4.33 (MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO)***
INDICATO ANCHE L'EVENTUALE RICORSO A RAME + DIMETORMORF/IPROVALICARB/BENTHIAVALIARB (CAA)***

Nota bene. Vista la pressione eccezionale di peronospora **in deroga*****

-è stato innalzato a **5** (anziché 4) il limite di utilizzo complessivo per i seguenti p.a appartenenti alla **famiglia dei caa** dimetomorf.mandipropamid.iprovalicarb.benthiavalicarb.valifenalate fermo restando quello massimo di 3 per la singola molecola ed il fatto che il quarto/quinto eventuale trattamento (con diversa molecola della famiglia dei caa) , debba essere intervallato da trattamento con molecola appartenente a famiglia chimica diversa.
-Innalzato a 4 (anziché 3) l'utilizzo di P.A appartenenti alle FENILAMMIDI

OIDIO

AGGIUNGERE ZOLFO BAGNABILE A DOSI MEDIE DI ETICHETTA

SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA OBBLIGATORIO

PER FLAVESCENZA DORATA:!

VEDASI QUADRO SPECIFICO CON DATE X COMUNE X INSETTICIDA