



*Servizio tecnico Colline novaresi*

## **MESSAGGIO NR 18 DEL 01/09/14**

RAGGIUNTA LA PIENA INVAIATURA DEL NEBBIOLO, IN SITI MEDI DI RIFERIMENTO, INTORNO AL 25 AGOSTO, PRECEDENDO, COME DATA, SOLO QUELLE DELLE ANNATE 2002-4-6-8-10.

### **PERONOSPORA :**

ENTRO LA PRIMA DECADE DEL MESE

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN ULTIMO TRATTAMENTO DI COPERTURA RAMEICA, BEN INDIRIZZTO ALLA PARTE ALTA DELLA VEGETAZIONE, SUI NEBBIOLI SICURAMENTE, E SULLE VARIETÀ PRECOCI (CROATINA IN PRT) SOPRATTUTTO DELLE ZONE PIÙ FREDDI.

### **BOTRITE**

SI RIBADISCE L'IMPORTANZA DELL' INTERVENTO FUNGICIDA SPECIFICO INDICATO NEI DUE PRECEDENTI BOLLETTINI DA EFFETTUARE, PER CHI NON L'AVESSE ANCORA FATTO IN FASCIA GRAPPOLI PREVIA COMPLEMENTARE OPERAZIONE DI SFOGLIATURA/ESPOSIZIONE/DIRADAMENTO DEI GRAPPOLI. LA COMPATTEZZA STRAORDINARIA CHE PRESENTANO I GRAPPOLI PREDISPONE ALLA FESSURAZIONE DELLE BUCCE, INSIEME AD ATTACCHI DI PERONOSPORA E/O GRANDINE E/O SCOTTATURE. SI OSSERVANO GIÀ DIFFUSAMENTE FOCOLAI

## **PRIME PREVISIONI VENDEMMIALI**

I PRIMI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI A PARTIRE DAL 22.8 SULLE UVE MOSTRANO IL SEGUENTE QUADRO, RIFERIBILE, PER **VITIGNO-A SITUAZIONI MEDIE**.

I **NEBBIOLI** PRESENTANO ACCUMULI ZUCCHERINI TRA I 13 ED I 15 BABO. MATURITÀ TECNOLOGICA, **CON ANDAMENTO METEOROLOGICO 'NORMALE'** PREVISTA VERSO LA FINE DELLA PRIMA DECADE DI OTTOBRE. CARICHI GENERALMENTE ABBASTANZA CONTENUTI. PER CUI SI CONSIGLIA DIRADAMENTO SELETTIVO SANITARIO E FINALIZZATO SOLO A TOGLIERE I GRAPPOLI CHE PRESENTANO ORA PALESI RITARDO DI INVAIATURA RISPETTO AGLI ALTRI,

**DECISAMENTE PIÙ IN RITARDO SONO TUTTI I PRECOCI.**

**ERBALUCE** (13-14 °BABO) E **CROATINA** (11-14 BABO) **DELLE ZONE PIÙ FREDDI IN PARTICOLARE**, MA ANCHE **VESPOLINA** (12-14°BABO), ED UVA RARA F(12.5-13.5 BABO). SULLA **VESPOLINA**, PROSPETTANDOSI PROBLEMATICHE SANITARIE LEGATE AL DISSECCAMENTO PRECOCE DEL RACHIDE, GIÀ IN CORSO, È VEROSIMILE MENTE LA RACCOLTA INTORNO 25 SETTEMBRE. STESSO DICASI PER L'ERBALUCE E CROATINA. SUCCESSIVAMENTE, A INIZIO OTTOBRE, UVA RARA.

SI PROSPETTA DUNQUE UN ACCORCIAMENTO DEI TEMPI DI DIFFERENZA, TRA LA VENDEMMIA DEI **'PRECOCI'** E QUELLA DEI **NEBBIOLI**. LA TENUTA SANITARIA È UN ULTERIORE ELEMENTO DI CRITICITÀ DA NON SOTTOVALUTARE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA RACCOLTA