



*Servizio tecnico Colline novaresi*

## **MESSAGGIO NR 4 DEL 23/04/14**

### **SITUAZIONE**

Sviluppo germoglio Nebbiolo medio 50 cm con 6-8 foglie distese ed infiorescenze in allungamento. L'inizio fioritura, con andamento meteorologico 'normale' è prevista prima del 20 di maggio. La croatina, anche delle zone più fredde raggiunge già i 15 cm. L'anticipo **fenologico-storico** ancora simile a quello del 2007- è attualmente stimabile in 2 settimane rispetto alla media. In altre parole lo sviluppo vegetativo che si osserva ora è quello che normalmente abbiamo intorno al 10 maggio...

### **PERONOSPORA**

Il passaggio piovoso tra venerdì e lunedì scorso ha apportato più di 50 mm totali. Probabile l'innesco di infezione primaria almeno sull'ultima pioggia. È previsto un nuovo picco di pioggia intensa domenica 27 aprile, **POTENZIALMENTE PERICOLOSA** in un contesto comunque instabile da sabato sera a martedì. Si ritiene pertanto necessario

### **INTERVENIRE CON IL SECONDO TRATTAMENTO TRA VENERDI 25 E SABATO 26 APRILE**

**ASSOLUTAMENTE IN CASO DI VIGNETI NON ANCORA TRATTATI.**

utilizzando prodotti di copertura contenenti

METIRAM(polyram df)  
DITIANON (delan 70 wg/ altri.)  
MANCOZEB(dithane m45, Aspor wdg, crittox mz80 o altri)  
PROPINEB(antracol 70wg)

In miscela estemporanea con CIMOXANIL (curzate, moxyl 20 wp, vitene /altri)  
Oppure già miscelati (curzate M- aliado 4-40, micexanil/altri)

In alternativa le seguenti miscele:  
ZOXAMIDE+FOSETIL AL+CIMOXANIL (electis trio)  
ZOXAMIDE+CIMOXANIL (lieto)  
MANCOZEB+CIMOXANIL+FOSETIL AL (vitene triplo-arpel triplo)  
AMETOCTRADINA+METIRAM (enervin top, prevint top)  
AMISULBROM+MANCOZEB(sanblight)

**LIMITI VINCOLANTI PREVISTI PER LE AZIENDE IN MIS 214.1 DEL PSR MA CONSIGLIATI A TUTTI I VITICOLTORI**  
MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO : MANCOZEB/CIMOXANIL/AMETOCTRADIN/ AMISULBROM IN TOTALE CON CIAZOFAMIDE  
MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO: ZOXAMIDE  
LIMITE DI UTILIZZO TEMPORALE ALL'ALLEGAGIONE: MANCOZEB/METIRAM/DITIANON/PROPINEB

### **OIDIO**

Aggiungere **zolfo bagnabile** (tiovit, tiowetting, kumulus tecno, sofreval ed altri) a dosi medio alte/ettolitro=hl, proporzionate agli ettolitre effettivi usati per trattare in questa fase.

(tipo 600 g/hl x 2,5 hl/ha)= 1,5- 2 max kg/ ettaro)

Il dosaggio inferiore può essere usato su vitigni meno sensibili come croatina/vespolina