

# 2020 DATE DEL SECONDO DEI DUE TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI

## CONTRO S.TITANUS. CICALINA VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA



zone	siti	comune	DATE PRIMO TRATTAMENTO			SECONDO TRATTAMENTO.			OBLIGATORIO
			PRODOTTI UTILIZZABILI (gruppo)			PRODOTTI UTILIZZABILI			
			A.1	B	C	a1	b	C	
FOCOLAI	PRECOCI	BARENGO BOGOGNO BORGOMANERO BRIONA CRESSA FARA NO.SE MARANO I.NO MEZZOMERICO SUNO SIZZANO	acetamiprid (neonicotinoidi)			PIRETROIDI O SIMIL Etofenprox acrinatrina	(neonicotinoidi) acetamiprid	Flupyradifurone	OBLIGATORIO
		BOCA/MAGGIORA CAVAGLIO D'AG CAVALLIRIO GHEMME GRIGNASCO ROMAGNANO S.				tau-fluvalinate *deltametrina (SOLO IN CASO PRESENZA POPILLIA)			
						<b>4.8 AGOSTO</b>			
						<b>5-9 AGOSTO</b>			
NELLE ZONE DI INSEDIAMENTO (LANDIONA E CARPIGIA)			VIGE LO STESSO OBBLIGO DI EFFETTUARE DUE TRATTAMENTI SEGUENDO LE INDICAZIONI DATE/PRODOTTI DEI SITI PRECOCI						

**CHIUNQUE NON RISPETTI GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI E' PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA 400,00 A 2.400,00 EURO**

NOTE PRATICHE AGGIUNTIVE TRATTARE CON VOLUMI D'ACQUA ALTI(ALMENO 500 L/HA) . **ACIDIFICARE** PORTANDO IL pH verso 6.0( p.es con Aceto a 0,5 l/hl)  
**VERIFICARE SEMPRE**  
**LIMITAZIONI USO IN ETICHETTA**

**I TRATTAMENTI SONO ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORI con le date indicate A SECONDA DEL COMUNE ANCHE SU UVA AMERICANA**

**E SU QUALSIASI PIANTA DI VITE ANCHE SINGOLA IN ORTI, CORTILI, GIARDINI, PERGOLATI. SPESSO SONO QUELLE PIÙ COLPITE!! DIFFONDERE L'INFO**

**SOLO ZONE/VIGNETI CON PRESENZA DI POPILLIA JAPONICA (IN NETTO CALO) : VEDERE LE PRECEDENTI NOTE NEI BOLL. 11-12**

PREFERIBILMENTE UTILIZZARE ACETAMIPRID (POSSIBILE 2 VOLTE CONSECUTIVE). OPPURE \*DELTAMETRINA

ATTENZIONE. SI RACCOMANDA DI NON SORPASSE IL LIMITE DI 2 TRATTAMENTI/ANNO COMPLESSIVI CON LE SA DEL GRUPPO A1  
**PER LA SALVAGUARDIA DEGLI INSETTI PRONUBI (LEGGE REG. N.20 DEL 3/8/98)**

SI RAMMENTA: DIVIETO TRATTAMENTI IN FIORITURA. **OBBLIGO SFALCIO PRELIMINARE FIORITURE SPONTANEE NEL VIGNETO. EVITARE DERIVA DOPO IL TRATTAMENTO TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO(ALMENO 48 H) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON I SINTOMI. QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DEL FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO)**

PIRETROIDI